

## Pfizer muestra su compromiso con los pacientes españoles de enfermedad inflamatoria intestinal

**La enfermedad inflamatoria intestinal afecta a aproximadamente 2,5 millones de personas en Europa<sup>1</sup>.**

**Se ha demostrado que la enfermedad inflamatoria intestinal produce alteraciones en el comportamiento agravando síntomas de depresión<sup>2</sup>.**

Madrid, 18 de mayo de 2018.- Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) el próximo sábado 19 de mayo, Pfizer muestra su compromiso con la comunidad científica y los pacientes de esta patología, que según la Sociedad Española de Patología Digestiva, afecta a una de cada 450 personas<sup>7</sup> en nuestro país. Se estima que la colitis ulcerosa (CU), es la enfermedad inflamatoria intestinal con mayor incidencia<sup>Error! Marcador no definido.,<sup>Error! Marcador no definido.</sup></sup>, se da en el 58% de los pacientes de EII en España, mientras que el 42% restante presenta la Enfermedad de Crohn (EC).

Aunque su causa exacta aún es desconocida, se cree que el origen de la EII está en una alteración del sistema inmune, que ataca a los tejidos del tubo digestivo provocando lesiones de distinta gravedad<sup>3,4</sup>. Los síntomas más comunes son diarrea con sangre, sensación de evacuación incompleta, dolor abdominal (calambres) y fatiga, lo que determina muy significativamente el día a día de los pacientes. Además, la mayoría de las personas afectadas desarrolla la enfermedad entre los 15 y los 30 años, y se suele ver un repunte de actividad en adultos entre 50 y 70 años<sup>Error! Marcador no definido.</sup>.

El impacto de la EII va más allá del ámbito físico y determina la vida diaria de las personas que viven con ella. Varios estudios han demostrado que la EII está relacionada con la aparición de alteraciones en el comportamiento de los pacientes. En concreto, se ha identificado un empeoramiento de la enfermedad inflamatoria intestinal ligado a la angustia psicológica y la depresión<sup>2</sup>. De hecho, existe un reconocimiento creciente de los expertos en este campo de que la angustia psicológica y la depresión pueden ser también responsables en la aparición y/o empeoramiento del curso de la EII, por lo que es necesario encaminar las soluciones terapéuticas hacia una aproximación holística y multidisciplinar.

*“Estas enfermedades afectan de manera significativa a personas que están comenzando a trazar sus planes de vida: jóvenes que se encuentran en momentos claves de su vida,*

*despegando en sus carreras profesionales o pensando en formar una familia”, afirma la doctora Susana Gómez, Directora Médica de la Unidad de Inflamación e Inmunología de Pfizer España. “Desde Pfizer no podemos dejar de apoyar a estas personas, que ven su día a día marcado por patologías tan determinantes”, concluye la doctora Gómez.*

#### **Pfizer, trabajando juntos por un mundo más sano®**

En Pfizer desarrollamos terapias innovadoras para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a través de la ciencia y de todos los recursos de los que disponemos. Nos esforzamos para que nuestros medicamentos estén a disposición de los pacientes y de los profesionales sanitarios, ajustándose a los más altos estándares de calidad y seguridad gracias al descubrimiento, desarrollo y fabricación de tratamientos para el cuidado de la salud.

Durante más de 150 años de compromiso con la sociedad, Pfizer en la actualidad cuenta con medicamentos, vacunas y algunos de los productos de consumo para el cuidado de la salud más conocidos del mundo. Los colaboradores de Pfizer se esfuerzan para mejorar el bienestar, la prevención y la eficacia de los tratamientos con los que cubrir las necesidades médicas de nuestro tiempo. Consecuentes con nuestra responsabilidad con las personas, colaboramos con todos los implicados para garantizar el acceso a nuestras medicinas y apoyar la mejor asistencia al paciente de manera asequible y fiable. Para obtener más información, por favor visítenos en [www.pfizer.es](http://www.pfizer.es).

#### **Para más información:**

##### **Pfizer Comunicación**

Belén Alguacil - 91 490 98 03  
[belen.alguacil@pfizer.com](mailto:belen.alguacil@pfizer.com)

##### **Ogilvy**

Elena Gracia – 91 451 21 28  
[elena.gracia@ogilvy.com](mailto:elena.gracia@ogilvy.com)  
Mariló Sánchez – 91 451 21 34  
[marilo.sanchez@ogilvy.com](mailto:marilo.sanchez@ogilvy.com)

---

<sup>1</sup> Burisch, J., Jess, T., Martinato, M., Lakatos, P. L., & ECCO-EpiCom. (2013). The burden of inflammatory bowel disease in Europe. *Journal of Crohn's and Colitis*, 7(4), 322-337.

<sup>2</sup> Confederación ACCU, El desafío emocional, disponible en <https://www.accuesp.com/crohn-y-colitis/vivir-con-la-enfermedad/el-desafio-emocional> Consultado en mayo de 2018.

<sup>3</sup> Magro F et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 1: Definitions, diagnosis, extra-intestinal manifestations, pregnancy, cancer surveillance, surgery, and ileo-anal pouch disorders. *J Crohns Colitis* 2017; 11: 649–70.

<sup>4</sup> NHS, Ulcerative colitis. Disponible en inglés en: <http://www.nhs.uk/Conditions/Ulcerative-colitis/Pages/Treatment.aspx> Consultado en septiembre de 2017.

<sup>7</sup> Sociedad Española de Patología Digestiva, 2014.